Quais as particularidades da Hemodiálise Crônica em Pediatria?

1933

www.conepmt.com.br

IPNA TEACHING COURSE

Dra. Maria Luiza M.do Val

Doença Renal Crônica

- Problema de Saúde Pública Mundial
- Estudo transversal com dados de centros de diálise das 5 regiões do país
- Prevalência: 20 casos pmic (2000 crianças em programa de diálise)
- Incidência: 7 casos pmic (500 casos novos por ano)

Doença Renal Crônica

Adaptado de MAK RH et al, 2012

Cenário

- HD e DP são necessárias como transição.
- Uso da DP diminuiu nos últimos 30 anos;
- Em 2010, o uso da HD superou o uso da DP pela primeira vez. (NAPRTCS)

Indicação de Diálise

- Taxa de filtração glomerular estimada de aproximadamente 10 a 15 mL/ min/ 1,73 m²
- Presença de anormalidades clínicas e bioquímicas (acidose metabólica descontrolada, hipercalemia, sobrecarga de líquidos, hipertensão e uremia sintomática)
- Incapacidade de fornecer uma nutrição adequada devido a restrições de líquidos e dietética
- Melhor controle da DMO-DRC
- Fadiga e desempenho escolar inadequado

Hemodiálise (HD) X Diálise Peritoneal (DP)

VANTAGENS

- Diminuição da carga do cuidador e diminuição do tempo total de tratamento;
- Maior interação social

Medway M, 2015
Tong A, 2008

Hemodiálise (HD) X Diálise Peritoneal (DP)

DESVANTAGENS

- Necessidade de acesso vascular a longo prazo
- Risco de infecções
- Restrições alimentares e de fluídos
- Maior impacto psicossocial das interrupções das atividades escolares e extracurriculares
- Maior velocidade de perda de função residual
- Aumento de atividade inflamatória e risco de doença cardiovascular

Contra-indicações para DP

Absolutas

- Onfalocele
- Gastrosquise
- Extrofia de bexiga
- Hérnia diafragmática

Relativas

- Cirurgia abdominal iminente
- Transplante renal com doador vivo em <3 meses
- Ausência de um cuidador ou ambiente familiar adequado

Origem dos pacientes

Tratamento prévio	N (%)
Diálise Peritoneal	99 (46,7)
Conservador	56 (26,4)
Sem tratamento prévio	24 (11,3)
Transplante prévio	7 (3,3)
Sem registro	26 (12,3)

N=212

Equipe Interdisciplinar

- Médico nefrologista pediátrico
- Enfermagem Especializada em diálise
- Técnicos em diálise
- Assistente social
- Psicólogo
- Terapeuta ocupacional
- Professor escolar
- Nutricionista
- Pai/ cuidador

Particularidades

A discussão sobre a prescrição de diálise inclui:

- **Frequência de diálise: HD convencional e diária;**
- **Duração da diálise;**
- **Modalidade de diálise: hemodiálise (HD) ou hemodiafiltração (HDF)**
- **Tipo de membrana: compatibilidade, permeabilidade e superfície;**
- **Anticoagulação.**

HD diária X HD convencional

- ↓ ganho peso interdialítico
- **Melhora a PA e função cardiovascular**
- ↓ doses de anti-hipertensivos
- **Melhora de variáveis associadas à uremia**
- ↓ quelantes de fosfato
- ↓ restrições alimentares
- **Melhora psicossocial**
- **Melhora da anemia**
- **Melhora do crescimento**

De Camargo MF et al, 2014

Fischbach et al , 2011

Fischbach et al , 2010

Geary et al, 2005

Principais parâmetros clínicos

- Adequação em diálise
- Acesso Venoso
- Nutrição
- Crescimento e Desenvolvimento
- Educação
- Inclusão Social/ Suporte a família
- Preparação para o transplante oportuno

Alvos terapêuticos

- Crescimento e nutrição
- Manejo de fluidos e pressão arterial,
- Saúde cardiovascular,
- Anemia,
- Doença mineral óssea
- Desenvolvimento neurocognitivo.

Acesso Vascular

Acesso vascular na saída	N (%)
Fístula arteriovenosa	87 (41,0)
Cateter de longa permanência	79 (37,3)
Cateter de curta permanência	40 (18,9)
Sem registro	6 (2,8)

Acesso Vascular em HD crônica
Unidade de Diálise UNIFESP* dados não publicados

N=212

- Fístula arteriovenosa
- Cateter de longa permanência
- Cateter de curta permanência
- Sem registro

Anemia

Etiologia :

- diminuição da produção de eritropoetina pelos rins,
- inflamação,
- hiperparatireoidismo secundário
- medicamentos
- produção de hepcidina
- menor tempo de vida dos eritrócitos
- aumento da perda de sangue intestinal
- aplasia pura de células vermelhas (raro)

Fadrowski et al, 2008
Atkinson MA, 2017

Anemia

- **Desfechos desfavoráveis: baixa qualidade de vida, ↓ capacidade neurocognitiva, ↓ qualidade de vida, hipertrofia ventricular esquerda e necessidade de transfusões sanguíneas.**
- **Maior risco de hospitalização e mortalidade do paciente.**
- **Meta de hemoglobina entre 11 e 12 g / dL para crianças em diálise (KDIGO e KDOQI)**
- **Tratamento : Uso de agente estimulante da eritropoetina e ferro intravenoso**
- **Dose alta de EPO, independente do nível de Hb, tem sido associada a maior mortalidade**

Anemia e Mortalidade

Borzych-Duzalka, 2012 Curvas de sobrevida atuarial de Kaplan-Meier para pacientes com média de Hb < 11 g / dL (painel esquerdo) e aqueles com dose equivalente média de AEE administrada < 6000 UI / m² / sem (painel direito).

Nutrição

- Desequilíbrio nutricional, a perda de energia proteica e a caquexia são comuns
- Má nutrição , inflamação sistêmica, condições de comorbidade, sobrecarga de líquidos e acidose metabólica.
- Efeitos adversos da desnutrição: déficit de crescimento e o atraso no neurodesenvolvimento.
- Avaliação de rotina por um nutricionista renal pediátrico deve ocorrer principalmente em pacientes pequenos
- Suplementação por via oral e / ou alimentação por sonda (nasogástrica ou gastrostomia) deve ser considerada.

Crescimento

Baixo crescimento secundário a:

- má nutrição,
- fatores metabólicos,
- anemia,
- distúrbios ósseos e minerais,
- fatores genéticos e
- alterações do eixo do hormônio de crescimento

Corrigir o equilíbrio líquido-eletrolítico e ácido-básico, bem como a prevenção e o tratamento da DMO.

Doença Mineral Óssea

- Promover o crescimento ideal, prevenir complicações de deformidades ósseas, calcificações extra-esqueléticas e hiperparatireoidismo secundário acentuado.
- Avaliação mensal de cálcio sérico, fósforo, fosfatase alcalina, bicarbonato, 25-hidroxivitamina D e PTH
- Ingestão adequada de cálcio na dieta
- Hiperfosfatemia → impacto negativo na DMO/ desfechos cardiovasculares. Uso criterioso de quelantes de fósforo (à base de cálcio e não cálcicos)

Saúde cardiovascular

- **Mortalidade cardiovascular 1000 vezes mais alta em comparação com os pares por idade.**
- **Hipertensão e a sobrecarga de fluidos → hipertrofia ventricular esquerda(em cerca de 50% dos pacientes em diálise),**
- **Avaliação regular do peso seco**
- **Ecocardiograma → cálculo do índice de massa ventricular esquerda e MAPA**

Desenvolvimento Neurocognitivo

Menor funcionamento intelectual, déficits de Memória, atenção e déficit cognitivo

Fatores contribuintes :

- anemia,
- hipertensão,
- doença cardiovascular,
- desnutrição,
- exposição ao alumínio e
- distúrbios convulsivos.

Desfecho em Pacientes em HD crônica

Desfecho	N (%)
Transplante renal	129 (60,8)
Transferência de unidade	33 (15,6)
Óbito	24 (11,3)
Diálise peritoneal	15 (7,1)
Tratamento conservador	7 (3,3)
Sem registro	4 (1,9)

N=212

Desfecho de pacientes em HD crônica
Unidade de Diálise UNIFESP

- Transplante renal
- Transferência de unidade
- Óbito
- Diálise peritoneal
- Tratamento conservador
- Sem registro

Total=212

Perspectivas

- **Eventos cardiovasculares → principal causa de morte,**
- **Melhora da sobrevivência nas últimas duas décadas com estimativas de sobrevida de 98%, 96% e 95% em 12, 24 e 36 meses (NAPRTCS)**

Perspectivas

- maior mortalidade com HD como modalidade inicial ,durante o primeiro ano de diálise,<5 anos, seguimento com nefrologista por curto período de tempo antes de iniciar a diálise.
- Preditores de diminuição da sobrevida :
 - ✓ idade mais jovem
 - ✓ raça negra
 - ✓ déficit de crescimento

Preparação para o transplante renal

- Encaminhamento para o Pré transplante
- Vigilância de Acesso
- Viabilização das correções urológicas
- Avaliação cardiovascular
- Monitorização da soroteca - Central de Transplantes
- Avaliação social e aderência
- Interface com o Transplante para discussão dos casos
- Investigação de Patologias associadas (Infecciosas e Distúrbios de Coagulação)

Conclusões

- Crianças com DRC em HD necessitam de monitorização e controle estrito das comorbidades para atingirem condições satisfatórias de saúde no momento do transplante renal;
- O controle da pressão arterial e da anemia pelo potencial de serem fatores de risco modificáveis devem ser considerados alvos terapêuticos;
- Estudos multicêntricos são necessários para elucidar a dose ideal de diálise a ser ofertada.

Quais os caminhos?

Para pensar...

Adriana Brier | Fotografia

Obrigada!